

Неврология и психиатрия

#Основой развития синдрома зависимости от пав (психоактивное вещество) являются :

- токсическое действие ПАВ на внутренние органы
- влияние ПАВ на потомство
- влияние ПАВ на нейрохимические процессы мозга
- наследственные факторы

#Приступообразные боли в одной половине лица, иногда со слезотечением, выделение слизи из носа, слюнотечением, возникают при:

- неврите лицевого нерва
- невралгии тройничного нерва
- шейном остеохондрозе
- опухоли головного мозга

#Причина геморрагического инсульта::

- гипертоническая болезнь
- сахарный диабет
- повышенная свертываемость крови
- новообразования ЦНС

#Основной симптом миастении:

- судороги
- мышечная утомляемость
- головная боль
- тремор кистей

#Характерный признак неврита лицевого нерва

- ригидность затылочных мышц
- приступообразные боли в одной половине лица
- рвота
- асимметрия лица

#Ощущение «треска» в шее при повороте головы характерно для:

- менингита
- остеохондроза
- энцефалита
- новообразования ЦНС

#Аура характерна для:

- геморрагического инсульта
- менингита
- энцефалита
- эпилепсии

#Паралич-это:

- отсутствие движений
- отсутствие чувствительности
- отсутствие речи
- отсутствие глотания

#Результат дополнительного исследования, позволяющий поставить диагноз менингит:

- увеличение СОЭ крови
- лейкоцитоз крови
- изменение ликвора
- лимфопения крови

#Диплопия -это:

- шум в ушах
- расстройство глотания
- снижение зрения
- двоение в глазах

#Неврит -это:

- воспаление нерва
- повреждение нерва
- опухоль по ходу нерва
- атрофия нерва

#Нистагм-это:

- разная величина зрачков
- расширение зрачков
- ритмичные колебательные движения глазных яблок
- опущение века

#Причина ишемического инсульта:

- гипертоническая болезнь
- тромбоз сосудов головного мозга
- сахарный диабет
- шейный остеохондроз

#Амавроз-это:

- отсутствие глотания
- отсутствие обоняния
- отсутствие зрения
- отсутствие чувствительности

#Приходящими нарушениями мозгового кровообращения считаются расстройства продолжительностью до:

- продолжительностью до:
- нескольких минут
- нескольких часов
- до суток
- нескольких суток

#Основной симптом шизофрении:

- отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний
- маниакальное возбуждение
- отвлекаемость
- амбулаторный автоматизм

#При ипохондрическом бреде больной считает, что:

- его обворовывают
- у него тяжелая болезнь
- он преступник
- его хотят отравить

#Дромомания — это:

- памяти
- эмоциональной сферы
- волевой сферы
- восприятия

#Деменция — это:

- легкая степень слабоумия
- тоскливое "угнетенное" настроение
- слабоумие, приобретенное в процессе болезни
- врожденное слабоумие

#Состояние выключенного сознания:

- кома
- делирий
- сумеречное помрачение сознания
- онейроид

#Повышенное стремление к деятельности характерно для:

- эпилепсии
- маниакальной фазы
- депрессивной фазы
- кататонического состояния

#Ятрогения — это болезненное состояние, возникающее в результате неправильного:

- медикаментозного лечения психических больных
- определения диагноза психического заболевания
- ухода за больными с психическим заболеванием
- поведения медицинского работника в отношении больного

#Расстройство восприятия — это:

- судороги
- галлюцинации
- бред
- делирий

#Галлюцинации — это:

- чувственное восприятие при отсутствии соответствующего внешнего объекта
- искаженное восприятие реально существующего раздражителя
- окружающие предметы видятся удвоенными
- выпадение половины поля зрения

#Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является:

- маниакальное состояние без склонности к агрессии
- состояние психического больного опасно для него и общества
- невротизм
- врожденное слабоумие

#Психогенные заболевания возникают под влиянием:

- тяжелой травмы головного мозга
- психических травм
- инфекции головного мозга
- алкогольных интоксикаций

#Характерный синдром алкогольного делирия (белая горячка):

- судорожный
- расстройство сознания
- слабоумие
- невротический

#В каком случае применяют искусственное кормление через зонд у психических больных?:

- психомоторное возбуждение
- маниакальное состояние
- отказ от пищи
- галлюцинации

#При уходе за депрессивными больными медицинский работник должен помнить о возможности возникновения у пациента:

- нарушения сознания
- совершении самоубийства
- совершении побега
- потери памяти

#Что такое эпилептический статус?

- малый эпилептический припадок
- большой эпилептический припадок
- серия эпилептических припадков, при которых больной не приходит в сознание
- предвестники эпилептического припадка

#Симптом Белла наблюдается при:

- невралгии тройничного нерва
- неврите лицевого нерва
- полиневрите
- остеохондрозе

#Свисающая кисть симптом поражения:

- тройничного нерва
- срединного нерва
- локтевого нерва
- лучевого нерва

#Воспаление оболочек мозга -это:

- энцефалит
- менингит
- миелит
- полиомиелит

#Воспаление вещества мозга -это:

- энцефалит
- менингит
- миелит
- полиомиелит

#Первичным менингитом является:

- туберкулезный
- эпидемический менингококковый цереброспинальный
- гнойный
- сифилитический

#Инфекционная болезнь детского возраста, сопровождающаяся поражением мотонейронов передних рогов спинного мозга и ядер черепных нервов:

- энцефалит
- полиомиелит
- менингит
- миелит

#Серозное воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек -это:

- энцефалит
- менингит
- миелит
- арахноидит

#Свисающая голова на грудь, опущенные плечи, атрофированные мышцы, руки висят вдоль туловища, гемипарез наблюдаются при:

- энцефалит
- менингит
- миелит
- полиомиелит

#Снижение силы мышц в правой или левой половине тела:

- монопарез
- гемипарез
- тетрапарез
- парапарез

#Разрыв аневризмы сосудов головного мозга-причина:

- геморрагического инсульта
- субарахноидального кровотечения
- преходящих нарушений мозгового кровообращения
- ишемический инсульт

#Совокупность симптомов, отражающих дисфункцию вегетативной регуляции является:

- мигрень
- гипоталамический синдром
- аллергические реакции
- вегето-сосудистая дистония

#Нарушение зрения: гемианопсия, зрительная агнозия, фотопсии, зрительные галлюцинации, наблюдаются при опухолях:

- затылочной доли
- височной доли
- IV желудочка мозга
- мозжечка

#Наиболее легкая и частая форма черепно-мозговой травмы, при которой преобладают не резко выраженные диффузные нарушения функций цнс:

- сотрясение головного мозга
- ушиб головного мозга
- сдавление головного мозга
- перелом свода черепа

#При транспортировке больных с травмами позвоночника нельзя:

- поднимать
- усаживать
- ставить на ноги
- все варианты верны

#Заболевание, обусловленное лишней 21-й хромосомой:

- синдром Шерешевского-Тернера
- болезнь Дауна
- синдром трисомии X
- синдром Клайнфельтера

#Избыточное скопление жидкости в полости черепа, сопровождающееся расширением желудочков мозга:

- микроцефалия
- гидроцефалия
- черепно-мозговая грыжа
- спинальная грыжа

#Тяжелая форма пищевой токсикоинфекции, встречающаяся при употреблении некачественных пищевых консервов (рыбных, мясных):

- ботулизм
- дифтерия
- дизентерия
- гепатит

#Расстройство речи в связи с поражением корковых центров:

- афазия
- агнозия
- атония
- атаксия

#Для болезни паркинсона характерно

- тремор кистей
- нарушение координации
- умственная деградация
- параличи конечностей

#Путь передачи клещевого энцефалита:

- трансмиссивный
- фекально-оральный
- воздушно-капельный
- половой

#Какой надзор назначается больным, психическое состояние которых представляет опасность для них самих или для окружающих:

- общее наблюдение
- строгий надзор
- усиленное наблюдение
- обычный режим

#Разнообразные неопределенные, неприятные, мучительные ощущения в разных частях тела и внутренних органах при отсутствии патологии этих органов называют:

- психическая анестезия
- сенестопатия
- психическая гипестезия
- психосенсорные расстройства

#Извращенное восприятие, при котором субъективный образ не соответствует реальному объекту:

- дереализация
- деперсонализация
- галлюцинации
- иллюзии

#Галлюцинаторные образы, возникающие не во внешней среде, а внутри больного (в голове, груди, животе и т.п.), не кажущиеся реальными и сопровождающиеся навязанностью какой-то посторонней силой:

- псевдогаллюцинации
- истинные галлюцинации
- простые галлюцинации
- сложные галлюцинации

#Пространные разглагольствования по несущественному поводу, характеризующиеся пустым, бесплодным многословием :

- вязкое мышление
- резонерство
- ускоренное мышление
- бессвязное мышление

#Расстройство характеризующиеся наплывом фантастических зрительных галлюцинаций, псевдогаллюцинаций и иллюзий:

- онейроид
- делирий
- амения
- сумеречное помрачение сознания

#Врожденное слабоумие -это:

- деменция
- олигофрения
- Корсаковский синдром
- тотальное слабоумие

#Генетическое заболевание, развивающееся во второй половине жизни, проявления обычно начинаются с нарушения памяти, ориентировки в пространстве, явлений апраксии:

- болезнь Пика
- болезнь Альцгеймера
- болезнь Крейтфельда-Якоба
- хорея Гентингтона

#Для какой фазы большого эпилептического припадка характерно: резкое напряжение всей мускулатуры, потеря сознания. больной падает на пол, появляется синюшность кожных покровов, непроизвольное мочеиспускание или дефекация:

- аура
- тоническая фаза
- клоническая фаза
- постприпадочное состояние

#Расстройства какой сферы не наблюдается у больных с диагнозом шизофрения:

- памяти
- эмоциональной
- волевой
- мышления

#Для какой формы шизофрении свойственно начало в юношеском возрасте с эмоционально-волевыми и интеллектуальными нарушениями, дурашливость, вычурное поведение, суетливость. могут появиться бредовые идеи и галлюцинации:

- простая
- гебефренная
- параноидная
- кататоническая

#Для какой фазы биполярно -аффективного расстройства характерна триада признаков: пониженное настроение, замедление мыслительного процесса и двигательная заторможенность:

- маниакальной
- депрессивной
- бывает при обоях
- не наблюдается не при одной

#Наиболее тяжелая степень олигофрении. коэффициент умственного развития ниже #больные беспомощны, нуждаются в надзоре и уходе:

- дебильность
- имбецильность
- идиотия

#К какому типу психопатии относятся пациенты, которые любой ценой стремятся оказаться в центре внимания, им необходима атмосфера восхищения, поклонения. у них наблюдается театральность в поведении:

- истероидные психопаты
- астенические психопаты
- возбудимые психопаты
- шизоидные психопаты

#У больного расстройство сознания по типу оглушения, движения некоординированные, речь невнятная, наблюдаются эпилептиформные припадки, непроизвольное мочеиспускание. концентрация алкоголя в крови 2,5-3‰ . какая степень опьянения:

- легкая степень
- средняя
- тяжелая
- большой трезв

#При какой концентрации алкоголя в крови наступает смерть:

- 0,5-1,5‰
- 1,5-2,5‰
- 2,5-3‰
- более 5‰

#На какой стадии хронического алкоголизма появляется выраженный абстинентный синдром (синдром отмены):

- первой (неврастенической)
- второй (наркологической)
- третьей (энцефалопатической)
- не наблюдает не при одной

#Какой препарат дают больному после небольшого количества алкоголя, с целью формирования у него рвотного рефлекса на алкоголь (условно-рефлекторная терапия)

- седуксен
- апоморфин
- эленум
- пирацетам

#Через какое время после прекращения приема алкоголя развивается алкогольный делирий (белая горячка):

- через несколько минут
- через несколько часов
- через несколько дней
- более 10 дней

#К какой группе наркотических средств относят морфин:

- каннабионды
- опиоиды
- снотворные
- стимуляторы

#Какой критерий не включает в себя термин «наркотическое средство» :

- медицинский
- социальный
- юридический
- человеческий

терапевтический профиль

#Метод дополнительного исследования при заболеваниях эндокринной системы:

-УЗИ почек

-ОАК

-Колоноскопия

-Кровь и моча на глюкозу

#Основной метод диагностики заболеваний кроветворных органов:

-Перкуссия

-Пальпация

-Пункция костного мозга

-Рентгенография костей

#Жалобы при заболеваниях поджелудочной железы:

-Плохой сон

-Жажда

-Боль в левом подреберье, опоясывающего характера

-Раздражительность

#«Сосудистые звездочки», «голова медузы», желтушность кожи характерны для заболеваний:

-Почек

-Сердца

-Кишечника

-Печени

#К субъективному методу исследования относятся:

-Сбор анамнеза

-Осмотр

-Пальпация

-Аускультация

#Горечь во рту, чувство тяжести в правом подреберье, характерные симптомы заболеваний:

-Желудка

-Кишечника

-Поджелудочной железы

-Печени

#Для сердечных отеков характерно:

-На лице

-На ногах

-Появляются к утру

-Бледные

#Урография применяется для диагностики заболеваний:

-Кишечника

-Почек

-Желчного пузыря

-Сердца

#Пониженное содержание кислорода в крови называется:

-Гиперкапния

-Гипоксемия

-Гипоксия

-Асфиксия

#К рентгенологическому методу исследования относится:

-Бронхоскопия

-Ректороманоскопия

-Ирригоскопия

-Колоноскопия

#К эндоскопическому методу исследования относится всё, кроме:

-Бронхоскопии

-Холецистографии

-Цистоскопия

-Колоноскопия

#Ирригоскопия применяется для исследования:

-12 перстной кишки

-Тонкого кишечника

-Толстого кишечника

-Мочевого пузыря

#Если суточный диурез составил у больного 300 мл, то этот симптом называется:

- Полиурия
- Никтурия
- Анурия
- Олигурия

#Плевральную пункцию с диагностической целью проводят при:

- Пневмонии
- Экссудативном плеврите
- Бронхиальной астме
- Хроническом бронхите

#Субъективные исследования включают всё, кроме:

- Жалобы
- История болезни
- Осмотр
- История жизни

#В межприступном периоде бронхиальной астмы применяют

- вентолин
- беротек
- серетид
- теофиллин

#Этиотропная терапия пневмококковой пневмонии

- гемохез
- пенициллин
- бромгексин
- эуфиллин

#При лечении гипертонической болезни применяют

- энalapрил, бисопролол
- дигоксин, димедрол
- омепразол, кларитромицин
- атропин, аспаркам

#При лечении атеросклероза следует исключить продукты, богатые

- витамином С
- железом
- калием
- холестерином

#При инфаркте миокарда наблюдается

- колющая боль в области сердца
- ноющая боль в области сердца
- сжимающая боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином
- сжимающая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином

#При наличии отеков больному рекомендуют

- ограничение приема жидкости и соли
- ограничение приема белков и жиров
- увеличение приема жидкости и соли
- увеличение приема белков и жиров

#При лечении хронического гепатита применяют препараты

- антибиотики
- гепатопротекторы
- антигистаминные
- нитрофураны

#При гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих путей для купирования боли эффективны

- антибиотики
- нитрофураны
- спазмолитики
- сульфаниламиды

#Этиотропное лечение острого пиелонефрита

- анальгин
- витамин С
- фуросемид
- ципрофлоксацин

#При лечении железодефицитной анемии препараты железа следует начинать вводить

- внутри
- внутривенно
- внутримышечно
- подкожно

#При лечении В12-дефицитной анемии применяют

- адреналин
- гепарин
- ферроплекс
- цианокобаламин

#Мерказол назначают при лечении

- гипотиреоза
- диффузного токсического зоба
- сахарного диабета
- эндемического зоба

#При лечении сахарного диабета второго типа применяют

- инсулин
- метформин
- мерказол
- тиреостом

#При лечении ревматоидного артрита применяют

- пенициллин, аспирин
- бисептол, фуросемид
- дибазол, папаверин
- вольтарен, метотрексат

#При скоплении экссудата в плевральной полости получается перкуторный звук:

- Тимпанический
- Ясный
- Притупленный
- Тупой

#При уменьшении воздушности легочной ткани получают перкуторный звук:

- Притупленный
- Коробочный
- Ясный
- Тупой

#Кал на копрологическое исследование отправляют:

- В клиническую лабораторию
- в биохимическую лабораторию
- в бактериологическую лабораторию
- в иммунологическую лабораторию

#Кровь для определения гликемического профиля берут:

- Из вены натощак
- Из вены трехкратно в течение дня
- Из пальца натощак
- Из пальца не менее 3х раз в течение дня

#Нормальный уровень сахара в крови:

- 2,2-3,2ммоль/л
- 3,3-6,0 ммоль/л
- 5,7-7,7ммоль/л
- 7,8-9,9ммоль/л

#Для определения функционального состояния почек проводится анализ мочи:

- Общий
- По методу Зимницкому
- По методу Нечипоренко
- Бактериологический

#Анализ мочи по Нечипоренко проводится для определения в единице объема

- Белка
- Глюкозы
- Ацетона
- Лейкоцитов, эритроцитов

#В норме при аускультации сердца выслушивается:

- Шум трения перикарда
- Систолический и диастолический шум
- Систолический и диастолический тоны
- Тоны открытия митрального клапана

#С помощью поверхностной пальпации живота можно оценить:

- Напряжение мышц передней брюшной стенки
- Размеры печени
- Локализацию печени
- Локализацию желчного пузыря нижний край печени

#К патологическому типу грудной клетки относится:

- Нормостеническая
- Астеническая
- Гиперстеническая
- Эмфизематозная

#При аускультации легких у здорового человека выслушивается:

- Везикулярное дыхание
- Жесткое дыхание
- Крепитация
- Сухие хрипы

#Число сердечных сокращений в норме:

- 16-20мин
- 20-40мин
- 60-80мин
- 80-100мин

#Информация о наследственности относится к:

- Истории жизни
- Истории болезни
- Объективному исследованию
- Жалобам

#Основная жалоба больного при бронхообструктивном синдроме:

- Кашель
- Слабость
- Боль в грудной клетке
- Одышка

#При густой вязкой мокроте рекомендуют

- Ацетилцистеин
- кодеин
- либексин
- морфин

#При лечении пневмонии применяют:

- антибиотики, отхаркивающие
- антибиотики, диуретики
- бронхолитики, глюкокортикостероиды
- бронхолитики, диуретики

#Патогенетическая терапия при активной фазе ревматизма проводится препаратами

- антибиотиками
- гипотензивными
- диуретиками
- нестероидными противовоспалительными

#При лечении хронической сердечной недостаточности применяют

- антибиотики, нитрофураны
- бронхолитики, муколитики
- глюкокортикостероиды, цитостатики
- ингибиторы АПФ, диуретики

#При застое крови в малом круге кровообращения больному следует придать положение

- горизонтальное
- горизонтальное с приподнятыми ногами
- коленно-локтевое
- полусидячее

#К гиполипидемическим препаратам относятся:

- статины
- бета-адреноблокаторы
- аспирин
- ингибиторы АПФ

#При лечении хронического гепатита применяют препараты

- антибиотики
- гепатопротекторы
- антигистаминные
- нитрофураны

#При лечении острого пиелонефрита применяют

- изониазид, димедрол
- нитроглицерин, карведилол
- нитроксолин, ампициллин
- энтеросептол, гепарин

#При ХПН в диете ограничивают

- белки
- витамины
- жиры
- углеводы

#При уремии применяют

- банки
- горчичники
- горячие ванны
- очистительную клизму

#Лечение острой постгеморрагической анемии

- гемотрансфузии, плазмозаменители
- анальгетики, спазмолитики
- гемотрансфузии, цитостатики
- анальгетики, диуретики

#Больше всего железа содержится в:

- крупе
- молоке
- мясе
- свекле

#При лечении лейкозов применяют

- антибиотики, витамины
- диуретики, сульфаниламиды
- нитрофураны, анальгетики
- цитостатики, глюкокортикостероиды

#Препараты, обладающие гипотензивным действием:

- каптоприл
- аспирин
- вольтарен
- гепарин

#Укажите соответствия поражения мозга при травмах:

1. легкая А сдавление
2. средняя Б сотрясение
3. тяжелая В ушиб

#Расставьте в правильной последовательности фазы большого эпилептического припадка:

1. фаза клонических судороги
2. постприпадочное состояние
3. аура
4. тоническая фаза

#Укажите соответствия умственной отсталости:

- 1 легкая А имбецильность
- 2 средняя (умеренная) Б идиотия
- 3 тяжелая В дебильность

#Укажите соответствия

- 1 опиоиды А марихуана
- 2 каннабиоиды Б морфин
- 3 стимуляторы В эфедрин

#Поражение корешков спинного мозга называется: #####

#Серозное воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек называют #####

#К какой черепно-мозговой травме относят повреждения, при которых целостность черепного апоневроза не нарушена?
#####

#Извращенное восприятие, при котором субъективный образ не соответствует реальному объекту — это: #####